APOGEO ®

Suspensión concentrada - REGISTRO DE VENTA ICA 2016

Fungicidas de uso agrícola

COMPOSICIÓN

Ingrediente Activo:
Azoxystrobin: …….. 200 g / litro
Methyl(E) - 2-(2(6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4- yloxy)phenyl)-3-methoxiacrylate
Difenoconazole …… 125 g/litro
3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

INFORMACIÓN GENERAL

APOGEO, es un fungicida sistémico de amplio espectro, perteneciente al grupo químico de las estrobilurinas y triazoles., Presenta "triple acción", con actividad preventiva, curativa y antiesporulante. Presenta una concentración ideal de Azoxystrobin y Difenoconazol. El contenido de Azoxistrobina brinda acción inhibitoria de la respiración mitocondrial en los hongos (acción temprana sobre esporas) y el contenido de Difenoconazol aporta efecto curative. La mezcla de ambos principios activos determina una acción combinada, bloqueando el proceso respiratorio y la síntesis de ergosterol en los hongos.

RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda aplicar el producto de manera preventiva y/o con la aparición de los primeros signos o síntomas de la enfermedad. Se realizará una sola aplicación del producto por ciclo de cultivo.

PRESENTACIONES

APOGEO se encuentra en presentaciones de 1, 4 y 20 litros.

RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

COMPATIBILIDAD

APOGEO es un producto que no debe ser mezclado con ningún tipo de fertilizantes, plaguicidas o surfactantes sin antes realizar una prueba de compatibilidad o consultar con un ingeniero agrónomo.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original.
Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

PRECAUCIONES Y ADEVRTENCIAS

No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al terminar la jornada de trabajo.

MANEJO DE ENVASES

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):
CISPROQUIM:
01-8000-916012 Fuera de Bogotá
2886012 En Bogotá.

agrocentro® Colombia, S.A.S.

DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo	Plaga	Dosis Lts/Ha	Período de Reentrada	Período de carencia
Arroz	Añublo de la vaina (Rhizoctonia oryzae-Sativae)	0.5 L/Ha	4 horas	10 días
Tomate	(Altemaria Solani)	0.375 L/Ha	4 horas	7 días
Tomate de Arbol	Antracnosis (colletotrichum gloesporoides)	0.3 L/Ha	4 horas	21 días

agrocentro® Colombia, S.A.S.

Transversal 55B # 114A-65, Bogotá, Colombia
Telefonos: 613-6939 y 613-6831
colombia@agrocentro.info
www.agrocentro.info

Colecta GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

PARA INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA CISPROQUIM 01 8000 916012 1800-59-3005
PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS CISPROQUIM 01 8000 916012 BOGOTÁ 286 6012