

BALLET®

Suspensión concentrada - REGISTRO DE VENTA ICA 0009

COMPOSICIÓN

Ingrediente Activo:

Byspiribac sodium:

2,6-bis [(4,6 - dimetoxipirimidin-2-il) oxil] benzoato de sodio 100 g/l a 20 oC.

INFORMACIÓN GENERAL

BALLET es un herbicida para el control de malezas en cultivos de arroz riego y secano favorecido. Es absorbido rápidamente por vía foliar y radicular, siendo translocado acropetal y basipetalmente. Previene el crecimiento de malezas susceptibles, al inhibir la acción de la enzima acetolactato sintasa (ALS), bloqueando así la biosíntesis de los aminoácidos de cadena. Las plantas susceptibles detienen su actividad competitiva con el cultivo poco tiempo después de la aplicación. La necrosis se observará pocos días después de la aplicación, dependiendo del estado de crecimiento y susceptibilidad de las malezas.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicarse en post-emergencia temprana al arroz y a las malezas, desde que las malezas tengan 1-2 hojas. Debe re-instalarse el riego, posterior a la aplicación, para obtener un mejor control de las malezas. Período de Carencia: 60 días.

En caso de escapes de Echinochloa colonum (Liendre puerco), se puede incrementar la dosis a 0.5 L/Ha en post-emergencia mediana-tardía.

Para obtener controles eficientes de las malezas mencionadas es absolutamente necesario que se use un surfactante no iónico a dosis de 0.1% v/v o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

PRESENTACIONES

BALLET se encuentra en presentación de 1 litro.

COMPATIBILIDAD

Para el control de las malezas que aparecen en el cuadro de campos de aplicación de esta etiqueta no se recomienda mezclar el producto con otros herbicidas. Para mezclarlo con otros productos herbicidas que permiten ampliar el espectro de acción y/o reducir el riesgo de desarrollo de resistencia, debe consultarse un Ingeniero Agrónomo. Antes de hacer aplicaciones masivas en mezclas con otros productos, es recomendable hacer pruebas en pequeña escala para verificar la compatibilidad física. No es compatible en mezcla con Propanil ni Triclopyr, ya que causa antagonismo en el control de ciertas malezas. No es compatible con productos de reacción alcalina.



de uso agrícola

PRECAUCIONES Y ADEVERTENCIAS

No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al terminar la jornada de trabajo.

RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

MANEJO DE ENVASES

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá

2886012 En Bogotá.

DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo	Plaga	Dosis Lts/Ha	Período de carencia
Arroz (Oryza sativa)	Liendre puerco: Echinochloa colonum (1), Tamarindillo: Aeschynomene sp, Espadilla: Corchorus orinocensis, Coquito: Cyperus esculentus, Cyperus iria, Guardarroci: Digitaria horizontalis, Botoncillo: Eclipta alba, Barba de indio: Fymbristylis annua, Fymbristylis miliacea, Falsa caminadora: Ischaemum rugosum, Palo de agua: Ludwigia linifolia, Piñita: Murdannia nudiflora	0.4 L/Ha	15 días



Transversal 55B # 114A-65, Bogotá, Colombia
 Telefonos: 613-6939 y 613-6831
 colombia@agrocentro.info
 www.agrocentro.info



Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

