

# BUTACLOR 600 EC<sup>®</sup>

Concentrado emulsionable - REGISTRO DE VENTA ICA 2574

## COMPOSICIÓN

Ingrediente Activo:

Butaclor:  
2-cloro-2,6 dietil-n-(butoximetil) acetanilada  
.....600 g/L  
de formulación a 20 oC.

## INFORMACIÓN GENERAL

BUTACLOR 600 EC es un herbicida sistémico pre-emergente recomendado para el control de gramíneas anuales y ciertas malezas de hoja ancha. El sitio de absorción más importante es el primer nudo de las plántulas en el proceso de germinación, inhibiendo el crecimiento y causando la muerte de las malezas. BUTACLOR 600 EC es fácilmente adsorbido en suelos pesados y con alto contenido de materia orgánica en el suelo. Además, es degradado lentamente por acción microbiana, fotodescomposición y volatilización.

Es importante una buena preparación y nivelación del terreno. Para una óptima efectividad es indispensable que el suelo tenga buena humedad; si el terreno está seco, se debe regar y después aplicar el BUTACLOR.

Es altamente eficiente para el control de malezas de:

Gramíneas:

- Liendrepuerco
- Paja de pato (*Echinochloa colonum*)
- Moco de pavo (*Echinochloa crusgalli*)
- Barba roja (*Echinochloa crusgallis*)
- Guarda rocío (*Digitaria sanguinalis*)
- Paja mona (*Leptochloa filiformis*)
- Pata de gallina (*Eleusine indica*)
- Cadillo (*Cenchrus brownii*)
- Falsa caminadora (*Ischaemum rugosum*)

Cyperaceas:

- Cortadera (*Cyperus diffusus*)
- Cortadera (*Cyperus esculentus*)
- Barba roja (*Echinochloa crusgallis*)

Hoja ancha:

- Bledo (*Amaranthus dubius*)
- Bledo espinoso (*Amaranthus spinosus*)
- Verdolaga (*Portulaca oleracea*)
- Clavito (*Jussiaea linifolia*)
- Viemes santo (*Phyllanthus niruri*)
- Uchuba (*Physalis angulata*)
- Palo de agua (*Ammania coccinea*)
- Lechecilla (*Euphorbia heterophylla*)



Herbidas



de uso agrícola

## RECOMENDACIONES DE USO

La dosis de BUTACLOR 600 recomendada está en un rango de 4 a 5 litros de producto comercial por Ha, según la textura del suelo. Se recomienda usarlo en mezcla con propanil en post-emergencia.

## PRESENTACIONES

BUTACLOR 600 se encuentra en presentaciones de 4, 20 y 200 litros.

## RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

## COMPATIBILIDAD

BUTACLOR 600 es compatible con la mayoría de los fertilizantes líquidos, herbidas e insectidas. Cuando se aplica la mezcla de tanque BUTACLOR 600 + Propanil debe cuidarse la incompatibilidad de Propanil con los productos organofosforados y carbamatos. Luego, se deberá dejar un intervalo de 10 días entre la aplicación de BUTACLOR 600 + Propanil y la aspersión de organofosforados; en el caso de BUTACLOR 600+ Propanil versus carbamatos el intervalo debe ser de 21 días.

## PRECAUCIONES Y ADEVERTENCIAS

No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al terminar la jornada de trabajo.

## MANEJO DE ENVASES

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

## ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original.

Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

## TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá

2886012 En Bogotá.

## DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Suelo	BUTACLOR 600 EC	PROPANIL (480 g/L)
Mediano a Pesado	5.0 Litros	7.2-8.6 Litros (1.9-2.5 galones)
Liviano	4.0 Litros	7.2-8.6 Litros (1.9-2.5 galones)




**agrocentro<sup>®</sup>**  
 Colombia, S.A.S.

Transversal 55B # 114A-65, Bogotá, Colombia  
 Telefonos: 613-6939 y 613-6831  
[colombia@agrocentro.info](mailto:colombia@agrocentro.info)  
[www.agrocentro.info](http://www.agrocentro.info)



Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

