

CYCO®

Polvo mojable - REGISTRO DE VENTA ICA 2048

COMPOSICIÓN

Ingredientes activos:

Cymoxanil

1 – (2 Ciano – 2 metoxilminoacetil) – 3etilúre.....4,0%

Oxidloruro de Cobre

(Equivalente a 18,9% de Cobre metálico)..... 35,0%

Ingredientes Aditivos e Inertes: 61,0%

INFORMACIÓN GENERAL

CYCO es un fungicida sistémico y de contacto, formulado como polvo mojable, indicado tanto en la prevención, como en el control de la gota o lancha de la papa, producida por el hongo *Phytophthora infestans*. Dada su doble acción, CYCO es especialmente útil cuando las condiciones ambientales (lluvia, con alta humedad relativa) favorecen la incidencia de la enfermedad.

La combinación de sus ingredientes activos, Cymoxanil y Oxidloruro de Cobre, brindan los mejores resultados. El primer ingrediente interfiere en la síntesis de proteínas a la vez que estimula la producción de fitoalexinas por las plantas, dificultando la infección. El segundo penetra en la planta, llegando a las estructuras del hongo que han conseguido instalarse en los tejidos; allí, el Cymoxanil afecta la respiración del patógeno, impidiendo, también la síntesis de ácidos nucleicos y el desarrollo del tubo germinativo de las esporas.

RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda disolver totalmente la cantidad de CYCO a usar en un balde. Coloque esta mezcla en el tanque, el cual debe estar con agua hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad. Agite y complete la cantidad de agua en el tanque, agitando hasta que la mezcla sea homogénea. Descarte los residuos, no los use de un día para otro.

CYCO es recomendado para el control de la gota o lancha de la papa, producida por el hongo *Phytophthora infestans* así como la roya del mismo cultivo *Puccinia pittieriana*. La dosificación del producto varía con la incidencia de la enfermedad y el estado de desarrollo del cultivo.

Como regla práctica, deben utilizarse de 500 a 1000 g. en 200 litros de agua o 50 a 100 g/bomba de 20 L, aplicando cada 7 a 14 días. La última aplicación debe hacerse 15 días antes de la cosecha. Siga siempre las recomendaciones de un ingeniero agrónomo o asistente técnico.

PRESENTACIONES

CYCO se encuentra en presentación de 250 mililitros.



Fungicidas



de uso agrícola

RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

COMPATIBILIDAD

CYCO es un producto que no debe ser mezclado con ningún tipo de fertilizantes, plaguicidas o surfactantes sin antes realizar una prueba de compatibilidad o consultar con un ingeniero agrónomo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al terminar la jornada de trabajo.

MANEJO DE ENVASES

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original.

Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá

2886012 En Bogotá.

DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo	Blanco Biológico	Dosis	Frecuencia de Aplicación	Intervalo entre última aplicación y cosecha
Papa (Solanum Tuberosum)	Gota (Phytophthora Infestans)	500-1000 g/200 L de agua o 50-100 g/bomba de 20L	Cada 7 a 14 días	15 días



ac agrocentro®
Colombia, S.A.S.

Transversal 55B # 114A-65, Bogotá, Colombia
Teléfonos: 613-6939 y 613-6831
colombia@agrocentro.info
www.colombia.agrocentro.com



Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

