

Forice 400 EC[®]

Formulación: Concentrado emulsionable
Registro ICA: Registro Nacional ICA No. 1804



Fungicidas

a c

de uso agrícola

COMPOSICIÓN

Ingredientes Activos:

Isoprothiolane: Di-isopropyl 1,3-dithiolan-2-ylidene-
malonate.....400 g/L en formulación a 20 oC.

INFORMACIÓN GENERAL

Forice 400 EC es un fungicida sistémico, protectante y curativo que penetra rápidamente por el follaje de la planta. Actúa en la Bio-síntesis de colina. En aplicaciones foliares es preventivo no solamente sobre las hojas tratadas si no también sobre las hojas nuevas formadas seis días después de su aplicación, en aplicaciones al follaje da protección óptima de 14 días.

RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda realizar una aplicación por ciclo de cosecha y dentro de un programa MIPE, aplicar cuando se presenten los primeros síntomas y/o de forma preventiva cuando se presenten las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de la enfermedad para evitar la resistencia al producto.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos y consultar con un ingeniero agrónomo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al terminar la jornada de trabajo.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

MANEJO DE ENVASES

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá

2886012 En Bogotá.

PRESENTACIONES

Forice 400 EC se encuentra en presentaciones de 5 y 20 litros.

DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo	Blanco Biológico	Dosis	P.C.	P.R.
Arroz	Piricularia (Pyricularia oryzae)	1.0 lts/Hta	21 días	12 h

*P.C.: Período de carencia

*P.R.: Período de Reentrada



agc agrocentro®
Colombia, S.A.S.

Transversal 55B # 114A-65, Bogotá, Colombia

Telefonos: 613-6939 y 613-6831

colombia@agrocentro.info

www.colombia.agrocentro.com



Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

