

# GALACTIKO SC<sup>®</sup>

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - REGISTRO DE VENTA ICA 2023



Fungicidas



de uso agrícola

## COMPOSICIÓN

Ingrediente Activo:

Trifloxystrobin: 100 g/L, 3-O-(2-Methyl (E)-methoxyimino-[(E)-a-[1-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminoxy]o-tolyl]acetate. Por litro de formulación a 20° C.

Tebuconazole: 200 g/L, (R, S) - 1-(4-Clorofenil) - 4, 4 - dimetil - 3-(1H-1, 2, 4 - triazol - 1 - ylmetil pentan - 3-ol. Por litro de formulación.

## INFORMACIÓN GENERAL

GALACTIKO es un fungicida preventivo-curativo de amplio espectro por las características que le dan sus ingredientes activos, ya que actúa inhibiendo la síntesis del esteroles (ergosterol) y sobre la respiración mitocondrial, tiene un efecto inhibitor de la germinación de las esporas del patógeno. pertenece al grupo químico de las estrobilurinas y triazoles. Controla y erradica enfermedades en plantas causadas por hongos, incrementando la productividad en los cultivos y reduciendo los daños durante el establecimiento y desarrollo.

Presenta una concentración ideal de Trifloxystrobin y Tebuconazole, ingredientes activos del producto, que impiden la proliferación del hongo, garantizando de esta forma resultados óptimos.

## RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda aplicar el producto de manera preventiva y/o con la aparición de los primeros signos o síntomas de la enfermedad. Se realizará una sola aplicación del producto por ciclo de cultivo.

## PRESENTACIONES

GALACTIKO se encuentra en presentaciones de 1, 4 y 20 litros.

## RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

## MANEJO DE ENVASES

SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DEL ENVASE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

## COMPATIBILIDAD

GALACTIKO es un producto que no debe ser mezclado con ningún tipo de fertilizantes, plaguicidas o surfactantes sin antes realizar una prueba de compatibilidad o consultar con un ingeniero agrónomo.

## PRECAUCIONES Y ADEVERTENCIAS

No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al terminar la jornada de trabajo.

## ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

## TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá

2886012 En Bogotá.

## DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Período de carencia	Período de Reentrada
Arroz	Añublo de la vaina ( <i>Rhizoctonia oryzae-Sativae</i> ) Pudrición de la vaina ( <i>Sarocladium oryzae</i> ) Anaranjamiento del arroz ( <i>Gaeumannomy graminis</i> ) Complejo manchado del grano ( <i>Cercospora</i> spp. <i>Helminthosporium</i> spp. <i>Curvularia</i> spp. <i>Sarocladium</i> spp)	0.8-1 L/Ha	14 días	4 horas
Tomate	Tizón temprano	0.5 L/Ha	14 días	4 horas
Uchuva	Alternaria ( <i>Alternaria Solani</i> )	0.5 L/Ha	14 días	4 horas



Transversal 55B # 114A-65, Bogotá, Colombia  
Teléfonos: 613-6939 y 613-6831  
colombia@agrocentro.info  
www.agrocentro.info



Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

