

# MAC<sup>®</sup>

Granulos Dispersables - REGISTRO DE VENTA ICA 1627

## COMPOSICIÓN

Ingrediente Activo:

Metsulfuron metyl ..... 600g/kg  
2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoic acid, de formulacion a 20°

Ingredientes aditivos:..... c.s.p. 20g

## INFORMACIÓN GENERAL

Metsulfuron metyl es un herbicida sistémico no-hormonal del grupo de las Sulfonylureas, el cual bloquea la síntesis de aminoácidos esenciales inhibiendo la enzima acetil lactato sintetasa (ALS), deteniendo la división celular y el crecimiento de las malezas con efecto residual para el control selectivo de malezas de hoja ancha, en aspersión foliar total sobre el cultivo del arroz y pasturas. Se debe evitar que la deriva de la aplicación llegue a cultivos de hoja ancha.

## RECOMENDACIONES DE USO

Llene el tanque de mezcla hasta la mitad con agua, comience a agitar y agregue la dosis del producto, 2g por cada 20 litros de agua. Complete el volumen final con agua y en lo posible adicionar un Surfactante de último cuando el tanque está casi lleno. En pasturas presenta excelentes resultados con la mezcla de 2cc de picloram 240 por litro de agua. Use de 200-400 litros de agua por hectárea en aplicación.

## PRESENTACIONES

Envase de 20g, 100g y 1kg.

## RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



# Herbidas



de uso agrícola

## COMPATIBILIDAD

Es compatible física y biológicamente con picloram, bentazon, 2, 4-D amina, Propanil, glifosato, ametrina, diuron. Las mezclas con insecticidas organofosforados pueden producir daño al cultivo. Con variedades nuevas haga pruebas a pequeña escala antes de usar el producto.

## PRECAUCIONES Y ADEVERTENCIAS

No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al terminar la jornada de trabajo.

## MANEJO DE ENVASES

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

## ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original.

Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

## TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):


CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá

2886012 En Bogotá.

## DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo	Plaga	Dosis	Período de Reentrada	Período de carencia
PRADERAS	Pega-pega ( <i>Desmodium tortuosum</i> ) Verdolaga ( <i>Portulacaoleracea</i> ) Palo de agua ( <i>Ammania coccinea</i> ) Dormidera ( <i>Mimosa spp</i> ) Chilinchil ( <i>Cassia tora</i> ) Botoncillo ( <i>Caperonia palustris</i> ) Bledo ( <i>Amaranthusdubius</i> ) Tripa de pollo ( <i>Euphorbia hirta</i> ) Botón blanco ( <i>Eclipta alba</i> )	2 gr por cada 20 litros de agua	N.A	6 Horas.
	ARROZ	Balsilla ( <i>Corchorus orinocensis</i> ) Helecho ( <i>Pteridium aquilinun</i> ) Mortiño ( <i>Clidemia sp</i> ) Escoba ( <i>Sida rhombifolia</i> )	30 gr por Hectárea	N.A



**ac agrocentro®**  
Colombia, S.A.S.

Transversal 55B # 114A-65, Bogotá, Colombia  
Teléfonos: 613-6939 y 613-6831  
colombia@agrocentro.info  
www.agrocentro.info



Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

