

# MAKIO 500 SC®

Suspensión concentrada - REGISTRO DE VENTA ICA 1932

## COMPOSICIÓN

Ingrediente Activo:

Carbendazim:

metil -2- benzimidazol carbamato 500 gramos por litro de producto formulado a 20°C

## INFORMACIÓN GENERAL

MAKIO 500 SC, con su ingrediente activo Carbendazim, es un fungicida sistémico, de amplio espectro, penetra en las plantas translocándose rápidamente. Al encontrar las células del hongo, interfiere con el proceso de división celular, la mitosis, interrumpiendo el crecimiento del hongo y por consiguiente la infección. Por ejercer MAKIO 500 SC una acción específica unisitio, se recomiendan aplicaciones alternadas con otros fungicidas de diferente sitio de acción y/o mezclas. MAKIO 500 SC actúa como preventivo y curativo.

## RECOMENDACIONES DE USO

Antes de la aplicación del producto realizar un monitoreo para identificar los niveles de la enfermedad de acuerdo al programa de manejo. Aplicar la mayor dosis cuando los niveles de infestación de la enfermedad sea alto y para garantizar un periodo de acción más prolongado.

## COMPATIBILIDAD

Es compatible con los plaguicidas de uso común. Sin embargo, es recomendable realizar pruebas antes de utilizarlo en mezclas y consultar con un ingeniero agrónomo.

## PRESENTACIONES

MAKIO 500 SC se encuentra en presentaciones de 1, 4 y 20 litros.



Fungicidas



de uso agrícola

## ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original.

Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al terminar la jornada de trabajo.

## MANEJO DE ENVASES

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

## RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

## TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá

2886012 En Bogotá.

## DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo	Blanco Biológico	Dosis Lts/Ha
Arroz	Añublo ( <i>Pyricularia oryzae</i> ) Mancha lineal ( <i>Cercospora oryzae</i> )	420-600 cc de PC/Ha
Banano	Sigatoka amarilla ( <i>Mycosphaerella muscicola</i> )	300-600 cc de PC/100 L de agua
Cafeto	Antracnosis ( <i>Colletotrichum coffeanum</i> ) Mancha de hierro ( <i>Cercospora coffeicola</i> ) Gotera ( <i>Mycena citricolor</i> ) Muerte descendente ( <i>Phoma</i> sp.)	120-1800 cc de PC/100 L de agua
Rosal	Cenicilla ( <i>Oidium</i> sp.)	30-36 cc de PC/ 1 Litro de agua
Tomate	Mancha de las hojas ( <i>Cercospora</i> sp.)	
Pimiento	Moho gris ( <i>Botrytis cinérea</i> )	
Frijol	Antracnosis ( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> )	
Crucíferas	Antracnosis ( <i>Colletotrichum</i> sp.)	



**a c agrocentro®**  
Colombia, S.A.S.

Transversal 55B # 114A-65, Bogotá, Colombia  
 Telefonos: 613-6939 y 613-6831  
 colombia@agrocentro.info  
 www.colombia.agrocentro.com



Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

