

# PENDIMETALINA AGROCENTRO 400 EC<sup>®</sup>

Concentrado emulsionable - REGISTRO DE VENTA ICA 1570



Herbicidas



de uso agrícola

## COMPOSICIÓN

Ingrediente Activo:

Pendimethalina: ..... 400 g/L

N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine, por Litro de formulación a 20°C

Ingredientes Aditivos e Inertes:... CSP 4 Litros

## INFORMACIÓN GENERAL

PENDIMETALINAAGROCENTRO 400 EC es un herbicida selectivo del grupo químico de las Dinitroanilinas, actúa siendo absorbido por las semillas, raíces u hojas de las malezas, afectando las plantas y causando la muerte después de la germinación o en el momento de la emergencia.

Gracias a su ingrediente activo, Pendimethalina, PENDIMETALINA AGROCENTRO 400 EC es selectivo al cultivo de arroz y puede ser usado en preemergencia sobre la semilla tapada. Puede también ser usado en postemergencia temprana en malezas que no tengan más de dos hojas.

## RECOMENDACIONES DE USO

El producto puede ser aplicado con aspersores terrestres, utilizando boquillas de cono hueco o cono sólido.

## PRESENTACIONES

PENDIMETALINAAGROCENTRO 400 EC se encuentra en presentaciones de 1, 4 y 20 litros.

## RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

## COMPATIBILIDAD

PENDIMETALINAAGROCENTRO 400 EC es un producto que no debe ser mezclado con ningún tipo de fertilizantes, plaguicidas o surfactantes sin antes realizar una prueba de compatibilidad o consultar con un ingeniero agrónomo.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al terminar la jornada de trabajo.

## MANEJO DE ENVASES

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

## ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original.

Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

## TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá

2886012 En Bogotá.

## DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo	Blanco Biológico	Dosis	Período de Reentrada	Período de carencia
Arroz	Pega Pega ( <i>Desmodium tortuo</i> ), Dormidera ( <i>Mimosa pudica</i> ), Escoba ( <i>Sida acuta</i> ), Lantana ( <i>lantana camara</i> ), Venadillo ( <i>Conyza bonaerensis</i> ), Verbena ( <i>Stachytarpheta cayennensis</i> ), Estrellita ( <i>Dichromena ciliata</i> ), Trébol flor blanca ( <i>Trifolium repens</i> ).	4 L/Ha	0 horas	15 días




**agrocentro**<sup>®</sup>  
 Colombia, S.A.S.

Transversal 55B # 114A-65, Bogotá, Colombia  
 Telefonos: 613-6939 y 613-6831  
[colombia@agrocentro.info](mailto:colombia@agrocentro.info)  
[www.colombia.agrocentro.com](http://www.colombia.agrocentro.com)



Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

